


РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОСЛЕ

ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗУБОВ

(ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ)





Сегодня Вам было проведено эндодонтическое лечение зуба.

Лечение корневых-это серьезное стоматологическое вмешательство , позволяющее сохранить зуб. Оно заключается в удалении инфицированных тканей из канала, путем механической , медикаментозной, ультразвуковой обработки каналов и пломбировании канала(ов) лечебным(временным) или постоянным материалом. Чтобы лечение прошло наиболее комфортно, соблюдайте рекомендации Вашего лечащего врача.

1. Эндодонтическое лечение проводится под обезболиванием . Эффект длится в течение 1-2 часов на верхней челюсти , на нижней значительно дольше 2-4 часа . Постарайтесь в этот промежуток времени не принимать пищу, чтобы не повредить (прикусить) мягкие ткани: щеки , язык и губы
2. После прекращения действия анестезии могут возникнуть ноющие боли или болезненность при накусывании на зуб. Это связано с естественной биологической реакцией организма на вмешательство или на пломбировочный материал в канале(ах) зуба, а также зависит от степени уже имеющегося воспаления на момент вашего обращения в тканях окружающих зуб. Такие ощущения могут сохраняться на протяжении нескольких суток . Рекомендуем на этот период: Ограничить жевательную нагрузку на пролеченный зуб

При необходимости принять таблетку болеутоляющего средства , рекомендованного врачом (Намесил, Кетанов, Нурофен)

Спасибо, что выбираете нас

 [maestrodental](#)

г.Курск

ул.Красной Армии 10

+7 (4712) 70-70-57,

+7 (910) 022-90-09

3. Не нагревайте область пролеченного зуба

4. После эндодонтического лечения зуб восстановлен **ВРЕМЕННОЙ** пломбой. Временная пломба может крошиться, в случае если пломба выпала полностью необходимо **НЕМЕДЛЕННО** обратиться к лечащему врачу , чтобы предотвратить попадание инфекции в корневую систему

5. После проведения лечения корневых каналов, коронка зуба ослаблена . Для исключения образования сколов, трещин, перелома зуба рекомендуется восстановление зуба постоянной пломбой или ортопедической конструкцией в течение от 2 недель до 1 месяца. Это позволит укрепить ослабленные стенки зуба, восстановить форму зуба и вернуть функцию жевания в данном участке